

## 黑龙江省主要乡土树种名录

序号	树种	拉丁学名	科、属	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类型							适宜区域
					荒山绿化	平原绿化	城市绿化	乡村绿化	通道绿化	采矿迹地绿化	水系绿化	
1	杉松 (沙松、辽东冷杉、白松)	<i>Abies holophylla</i> Maxim.	松科、冷杉属	幼年耐荫，10年生以后喜光。耐寒，不耐酷寒，不耐干旱、水淹、风沙，不耐盐碱，不耐空气污染。幼年露地越冬安全性差，需覆盖。慢生，主要用于纸浆材、工业用材。可生长于阴湿的缓山坡、排水良好的平湿地和天然针阔叶混交林。			○	○	○			<b>哈尔滨市：</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市：</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市。
2	红皮云杉 (红皮臭)	<i>Picea koraiensis</i> Nakai.	松科、云杉属	幼年耐荫，5年后喜光。耐酷寒，不耐水淹和盐碱。慢生树种，主要用于用材、林化工业原料，水源涵养。常生于河岸、沟谷、林缘、溪流旁及向阳山坡等处，适于微酸性沙土地。	○	○	○	○	○	○		<b>哈尔滨市：</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市：</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市：</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市：</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市：</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市：</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市：</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市：</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市：</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>黑河市：</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区：</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。

3	鱼鳞云杉 (鱼鳞松)	<i>Picea jezoensis</i> var. <i>microsperrima</i> (Lindl.) Cheng et L.K.Fu	松科、 云杉属	幼年耐荫。耐酷寒，耐高海拔山地气候，不耐水淹、干旱，不耐盐碱和空气污染。慢生树种，主要用于用材、林化工业原料，水源涵养。适生于山坡中腹以上，排水良好的山坡。	○	○	○								<p><b>哈尔滨市：</b>阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、塔河县。</p>
4	落叶松 (兴安落叶松、意气松)	<i>Larix gmelinii</i> (Rupr.) Kuzen.	松科、 落叶松属	喜光。耐酷寒，较耐干旱，耐轻盐碱。速生，主要用于用材、林化工业原料、水源涵养。常生于山麓、沼泽、草甸、山坡、河谷及山顶等，适于土层深厚、肥润、排水良好的北向缓坡及丘陵地带。	○	○	○	○							<p><b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
5	黄花落叶松 (长白落叶松、海林落叶松)	<i>Larix olgensis</i> A.Henry.	松科、 落叶松属	喜光。耐寒，但耐寒性略低于兴安落叶松，耐轻盐碱，贪肥、水，喜钙，不耐水淹。速生树种，主要用于用材、林化工业原料、水源涵养、水土保持。适生于水沟、阴湿的山坡及火山灰质地和石砾子。	○	○	○	○	○						<p><b>哈尔滨市：</b>阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>大箐山县、南岔县、铁力市。</p>

6	红松 (朝鲜松、 果松)	<i>Pinus koraiensis</i> Sieb.et Zucc.	松科、 松属	幼年耐荫，5年生后喜光。耐酷寒，不耐干旱、高温，不耐盐碱和空气污染。慢生树种，主要用于用材、果林、水源涵养、水土保持。常与红皮云杉、臭冷杉、白桦、紫椴、水曲柳、黄檗、胡桃楸及蒙古栎等树种混生。可生长于气候温暖、湿润棕色森林土地带。	○	○	○				<b>哈尔滨市</b> ：阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市</b> ：东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市</b> ：向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市； <b>鸡西市</b> ：鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市</b> ：尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市</b> ：新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市</b> ：向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市</b> ：伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>黑河市</b> ：爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。
7	偃松 (爬松、矮 松)	<i>Pinus pumila</i> (Pall.) Regel	松科、 松属	阳性树种，但稍耐庇荫。耐寒、抗风。慢生树种，主要用于水土保持。常生于土层浅薄、气候寒冷的高山上部的阴湿地带或更高海拔的山顶。					○		<b>哈尔滨市</b> ：尚志市、五常市； <b>牡丹江市</b> ：林口县、海林市； <b>伊春市</b> ：伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>黑河市</b> ：爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区</b> ：加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县。
8	兴凯赤松 (兴凯松、 兴凯湖松)	<i>Pinus takahasii</i> Nakai	松科、 松属	阳性树种。耐干旱、贫瘠，抗风。中生树种，主要用于水土保持。常生于湖边沙丘及山顶石砾土。	○	○	○	○			<b>鸡西市</b> ：鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市。
9	樟子松 (海拉尔 松)	<i>Pinus sylvestris</i> L. var. <i>mongolica</i> Litv.	松科、 松属	喜光。耐酷寒、干旱、瘠薄，耐轻盐碱。中生树种，主要用于用材、防风固沙、水源涵养。常生于土壤水分较少的山脊、向阳山坡、以及较干旱的砂地及石砾砂土地区。	○	○	○	○	○	○	<b>哈尔滨市</b> ：道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市</b> ：东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市</b> ：向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市</b> ：鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市</b> ：尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市</b> ：新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市</b> ：向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市</b> ：伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市</b> ：北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>黑河市</b> ：爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区</b> ：加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。

10	兴安圆柏 (兴安松)	<i>Juniperus davurica</i> (Pall) .Ant.	柏科、 圆柏属	阳性树种。耐酷寒、干旱、瘠薄，耐轻盐碱。慢生树种，主要用于风景林。常生于湿润沙壤土、山峰岩石间、高山顶部、山坡或林下等处。			○	○				<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县。</p>
11	杜松 (崩松、刚松)	<i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.	柏科、 刺柏属	强阳性树种。耐干旱、瘠薄，耐轻盐碱，不耐酷寒。慢生树种，主要用于风景林。常生于山顶或向阳湿润沙质山坡、干燥的砂砾地和岩缝。			○	○				<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

12	东北红豆杉 (紫杉)	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	红豆杉科、红豆杉属	耐阴树种。耐腐，韧性强，不耐酷寒、干旱、风沙，不耐瘠薄与盐碱，喜湿润怕水涝。慢生珍贵树种，主要用于景观绿化、经济林。常生于湿润肥沃的针阔混交林，可生于山顶多石和瘠薄的土壤，适于疏松湿润排水良好的砂质土壤。	○	○	○	○				<p><b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>
13	山杨	<i>Populus davidiana</i> Dode	杨柳科、杨属	喜光。耐寒、耐干旱瘠薄。速生，先锋用材树种。常生长于山坡中下腹，可生长于微酸性至中性土壤，适于山腹以下排水良好肥沃土壤。	○		○	○	○			<p><b>哈尔滨市:</b>阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县。</p>
14	甜杨	<i>Populus suaveolens</i> Fisch	杨柳科、杨属	喜光，耐酷寒，不耐贫瘠、干旱和盐碱。主要用于速生丰产用材和水源涵养。常生于排水良好的砂砾碎石土壤，适于土壤厚度和肥力较好栽培环境。				○	○	○		<p><b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县。</p>

15	香杨	<i>Populus koreana</i> Rehd.	杨柳科、杨属	喜光，喜冷湿，耐寒，不耐贫瘠和盐碱，速生树种，主要用于工业原料用材、速生丰产用材、水源涵养、木质能源和环境保护。常生于河边、溪边谷地，与红松混生或生于阔叶树林中。喜湿润肥沃土壤。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市。
16	大青杨	<i>Populus ussuriensis</i> Kom.	杨柳科、杨属	喜光。耐寒。速生树种，主要用于用材。常生于山坡下腹及河谷两岸，适于湿润肥沃、排水良好的土壤。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。
17	小黑杨	<i>Populus × xiaohei</i> T. S. Hwang et Liang	杨柳科、杨属	喜光。喜冷湿气候，耐寒、耐旱、耐瘠薄和盐碱。速生树种，主要用于用材和景观绿化。适于地势平坦，土壤肥沃，排水良好的砂质壤土。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、孙吴县、北安市、五大连池市。

18	银中杨	<i>Populus alba</i> × <i>P. berolinensis</i>	杨柳科、杨属	强阳性树种。耐酷寒、干旱、土壤贫瘠和轻盐碱，抗病虫。速生，主要用于景观绿化。适于砂质壤土。		○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
19	迎春5号	<i>Populus</i> × 'Sanbei I'	杨柳科、杨属	强阳性树种。耐严寒、土壤贫瘠和盐碱，抗病虫。速生树种，主要用于景观绿化和用材。适于平原、东部山区低平地带。		○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县。</p>

20	旱柳	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	杨柳科、柳属	喜光。耐寒、耐旱、耐弱盐碱，喜水湿，抗风。速生树种，主要用于用材、林化工业原料、水源涵养、木质能源和环境保护。适于湿润而排水良好的土壤。		○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县。</p>
21	垂柳 (垂丝柳、水柳、清明柳)	<i>Salix babylonica</i> Linn.	杨柳科、柳属	强阳性树种。耐寒，耐旱、耐水淹和轻盐碱。中生树种，主要用于景观绿化。适于酸性及中性土壤。		○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、丰林县、大箐山县、南岔县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

22	粉枝柳 (苏古特日图-巴日嘎苏、簸箕柳、红毛柳)	<i>Salix rorida</i> Laksch.	杨柳科、柳属	喜光，喜湿润，耐寒。主要用于用材、林副特产、绿化和护岸。常生于河岸、溪边和林区山地。喜湿润肥沃土壤。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、丰林县、大箐山县、南岔县、铁力市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县。
23	蒿柳	<i>Salix viminalis</i> L.	杨柳科、柳属	喜光，极耐水湿，耐严寒。主要用于林副特产、用材、饲料、绿化、工业原料和护岸。常生于溪流及河流两岸的水湿地或林缘。对土壤适应性强。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、丰林县、大箐山县、南岔县、铁力市。
24	胡桃楸 (核桃楸、楸子、山核桃)	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	胡桃科、胡桃属	喜光。耐寒，耐湿，耐轻盐碱，不耐水淹。中生珍贵树种，主要用于用材、林化工业原料、水源涵养、林果、药用、环境保护。喜温凉湿润气候，适生于土层深厚、肥沃、排水良好的山中下腹或河岸腐殖质多的湿润疏松土壤。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。

25	榛 (平榛)	<i>Corylus heterophylla</i> Fish ex.Trautv.	桦木 科、榛 属	喜光。抗寒。速生树种，主要用于防风固沙、林果。常生于疏灌林地、林缘，对土壤的适应性较强，适于砂壤土。	○	○					<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
26	毛榛	<i>Corylus mandshurica</i> Maxim.et Rupr.	桦木 科、榛 属	喜光。耐寒。速生树种，主要用于防风固沙、水土保持、林果。常生于林缘、河谷地带，对土壤的适应性较强，喜中性及微酸性湿润肥沃砂壤土。	○	○					<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>

27	东北桤木 (东北赤杨)	<i>Alnus mandshurica</i> Call.ex Schneid.	桦木 科、赤 杨属	喜光。耐寒，耐水淹，不耐风沙。速生树种，主要用于用材。常生于海拔 100-1700m 的林边、河岸或山坡林中。适于疏松肥沃的砂壤土、壤土或轻壤土。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
28	白桦 (粉桦)	<i>Betula platyphylla</i> Suk.	桦木 科、桦 木属	强阳性先锋树种。耐严寒，不耐庇荫。速生，主要用于用材、水土保持、水源涵养。对土壤适应性强，喜酸性湿润土壤。	○	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

29	黑桦 (臭桦、棘皮桦)	<i>Betula dahurica</i> Pall.	桦木科、桦木属	强阳性树种，喜光。耐寒，耐贫瘠、干旱，抗风。主要用于用材。常生于海拔400-1300米阳坡土层较厚的阔叶林内。	○	○	○	○			<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河30县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
30	蒙古栎 (柞树、蒙古柞、不落叶)	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb.	壳斗科、栎属	喜光，幼时喜侧方庇荫。耐酷寒、干旱、贫瘠，耐空气污染和轻盐碱。慢生珍贵树种，主要用于用材、水源涵养、水土保持、林化工业原料、环境保护。喜温凉气候，对土壤条件适应范围较广，能适应干旱瘠薄的土壤。	○	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>



34	榆树 (家榆、白榆)	<i>Ulmus pumila</i> Linn.	榆科、榆属	喜光。耐寒，耐干旱瘠薄和盐碱，不耐水湿。速生树种，主要用于用材、林化工业原料、水源涵养 and 环境保护。喜干凉气候，适于肥沃、湿润、排水良好的土壤。	○	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
35	春榆 (白杆榆、白皮榆)	<i>Ulmus japonica</i> (Rehd.) Sarg.	榆科、榆属	喜光。耐酷寒和大气污染，稍耐干旱。速生、珍贵树种，主要用于用材、林化工业原料、水源涵养 and 环境保护。适于河岸、溪旁、沟谷、山麓及排水良好的冲积地和山坡。	○	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b>阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、丰林县、大箐山县、南岔县、铁力市。</p>

36	五味子 (山花椒)	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	木兰 科、五 味子属	喜光。不耐旱。主要用于药用。 常生于杂木林、林缘或灌木丛 中，缠绕在其它林木上生长。 适生于沟谷、溪旁、山坡的肥 沃、排水良好、微酸性腐殖土。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>塔河县。</p>
37	光萼溲疏 (千层皮)	<i>Deutzia glabata</i> Kom.	虎耳草 科、溲 疏属	喜光。耐干旱、瘠薄。主要用 于景观绿化。常生于山地石隙 间或山坡林下。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

38	东北溲疏 (千层皮)	<i>Deutzia amurensis</i> (Regel) Airy-Shaw	虎耳草 科、溲 疏属	阳性树种，喜光。耐瘠薄，稍耐庇荫。主要用于景观绿化。常生于采伐迹地或次生阔叶林中。喜排水良好壤土或砂壤土。			○	○	○		<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>齐齐哈尔市:</b> 龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市； <b>大庆市:</b> 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。
39	东北山梅花	<i>Philadelphus schrenkii</i> Rupr.	虎耳草 科、山 梅花属	稍喜阴。耐寒。主要用于景观绿化。常生于杂木林中，植株丛生或单生。			○	○	○		<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>齐齐哈尔市:</b> 龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市； <b>大庆市:</b> 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。

40	刺果茶藨子	<i>Ribes burejense</i> Fr. Schmidt	虎耳草科、茶藨属	耐寒，耐旱，耐盐碱和水湿。主要用于防风固沙。常生于山地针叶林、阔叶林或针阔叶混交林下及林缘，也见于山坡灌丛及溪流旁。沙土、黄土、重盐碱土均可生长。		○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
41	东北茶藨子 (灯龙果)	<i>Ribes manshuricum</i> (Maxim) Kom.	虎耳草科、茶藨属	较耐阴。主要用于防风固沙、景观绿化。常生于针阔叶混交林或次生阔叶林。适生于平缓地势的土层深厚、透气性较好的砂壤土、壤土和轻黏壤土。		○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

42	黑果茶藨子 (黑加仑、 旱葡萄)	<i>Ribes nigrum</i> Linn.	虎耳草 科、茶 藨属	喜光。耐酷寒，稍耐湿，不耐 贫瘠。主要用于防风固沙、林 果。适生于林下或林缘，喜肥 沃土壤。			○	○	○			<b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林 市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙 吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新 林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。
43	双刺茶藨子 (楔叶茶藨 子)	<i>Ribes diacantha</i> Pall.	虎耳草 科、茶 藨属	较耐旱，耐酷寒。主要用于景 观绿化。常生于山坡、河岸林 下或固定沙丘。			○	○	○			<b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大 兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、 漠河市。
44	柳叶绣线菊	<i>Spiraea salicifolia</i> Linn.	蔷薇 科、绣 线菊属	落叶灌木，喜光。耐酷寒、喜 湿、耐阴、耐寒、根孽力强。 主要用于景观绿化。喜肥沃湿 润土壤。一般生于河岸、湿草 地、河谷、林缘、草泽地。			○	○	○	○		<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、 延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安 区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、 同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、 麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方 台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、 桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安 区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好 区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、 安达市、肇东市、海伦市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、 北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼 中区、呼玛县、塔河县、漠河市。

45	珍珠梅 (山高粱)	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Br.	蔷薇科、珍珠梅属	落叶灌木，阳性树种。喜光，喜湿。耐酷寒干旱，耐贫瘠、轻盐碱。主要用于景观绿化。多生于河岸或山坡溪流、林缘附近。		○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
46	山楂 (山里红)	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bge.	蔷薇科、山楂属	喜光。耐阴、耐严寒、耐轻盐碱和大气污染。主要用于景观绿化和林果。常生于河岸、山坡山麓、河谷杂木林中，或灌丛中。	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙县。</p>

47	水榆花楸 (苗榆)	<i>Sorbus alnifolia</i> (Sieb. & Zucc.) K. Koch.	蔷薇科、花楸属	喜光, 耐阴。稍耐寒, 耐盐碱。主要用于景观绿化。常生于林内林缘及灌丛中。喜湿润而排水良好的土壤。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市; <b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市; <b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市; <b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市; <b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县; <b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县; <b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县; <b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>
48	花楸树	<i>Sorbus pohuashanensis</i> (Hance) Hedl.	蔷薇科、花楸属	耐阴树种。耐酷寒、轻盐碱和大气污染。主要用于景观绿化。常生于较高海拔的山地云冷杉针叶林。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市; <b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市; <b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市; <b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市; <b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县; <b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县; <b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县; <b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市; <b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市; <b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市; <b>兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市; <b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市; <b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

49	秋子梨 (山梨)	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	蔷薇 科、梨 属	喜光，稍耐阴。耐严寒和轻盐碱。主要用于景观绿化和林果。常生于山丘河流两旁或土质肥沃的山坡。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市。</p>
50	山荆子 (山丁子)	<i>Malus baccata</i> (Linn.) Borkh.	蔷薇 科、苹 果属	喜光，稍耐荫。耐寒，耐旱，不耐盐碱。主要用于景观绿化和林果。常生于疏林地或林缘，除盐碱地外山、丘、平原均可栽培。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>

51	花红	<i>Malus asiatica</i> Nakai.	蔷薇科、苹果属	阳性树种，喜光。耐寒，耐旱，不耐涝。主要用于景观绿化和林果。常生于排水良好的砂质土或肥沃土上。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市。</p>
52	金露梅 (金老梅)	<i>Potentilla fruticosa</i> Linn.	蔷薇科、委陵菜属	喜光。喜湿润。耐酷寒、干旱、贫瘠、轻盐碱。主要用于景观绿化。常生于亚高山或高山林缘、草地。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

53	银露梅 (银老梅)	<i>Potentilla glabra</i> Lodd.	蔷薇科、委陵菜属	落叶小灌木，阳性树种。喜光。耐酷寒、干旱、贫瘠、轻盐碱。主要用于景观绿化。常生于高海拔，多岩石处。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
54	小叶金露梅	<i>Potentilla tenuifolia</i> Fisch.	蔷薇科、委陵菜属	落叶小灌木，喜光。耐酷寒、干旱、贫瘠、轻盐碱。主要用于景观绿化。常生于草原山地石缝间。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

55	山楂叶悬钩子 (别名: 托盘、树莓)	<i>Rubus crataegifolius</i> Bge.Bunge.	蔷薇科、悬钩子属	阳性植物, 喜光。耐寒、贫瘠。耐轻盐碱。不耐干旱, 不耐水淹。主要用于林果。常生向阳山坡灌木丛中或林缘, 在山沟、路边成群生长。喜肥沃湿润土壤。	○	○	○	○			<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市; <b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市; <b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市; <b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市; <b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县; <b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县; <b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县; <b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市; <b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市; <b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市; <b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市。</p>
56	黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i> Lindl.	蔷薇科、蔷薇属	喜光, 不耐荫。耐轻盐碱, 不耐酷寒。主要用于景观绿化。喜肥沃土壤。		○	○	○			<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市; <b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市; <b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市; <b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市; <b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市; <b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市; <b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

57	山刺梅 (刺玫蔷薇)	<i>Rosa davurica</i> pall.	蔷薇科、蔷薇属	阳性树种，喜光，稍耐阴。耐酷寒和轻盐碱，喜湿，不耐水淹。主要用于景观绿化。常生于开旷地、河岸、阔叶疏林内或林缘灌丛内。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。</p>
58	榆叶梅	<i>Amygdalus triloba</i> (Lindl.) Ricker	蔷薇科、桃属	阳性树种，喜光。耐严寒、干旱、贫瘠和轻盐碱。主要用于景观绿化。适应性强，喜湿润肥沃土壤。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇源县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

59	山杏 (西伯利亚杏)	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam.	蔷薇科、杏属	阳性树种，喜光。耐严寒、干旱、贫瘠、风沙和轻盐碱，对氟化物污染反应敏感。主要用于景观绿化和木本粮油原料。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市。</p>
60	李	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	蔷薇科、李属	喜光，稍耐阴。耐寒，耐轻盐碱。主要用于景观绿化和林果。可生于酸性土或钙质土，适于湿润粘质土。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、三集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市。</p>

61	毛樱桃	<i>Prunus tomentosa</i> (Thunb.)	蔷薇科、樱属	阳性树种，喜光，稍耐阴。耐寒，耐干旱、贫瘠和轻盐碱。主要用于景观绿化和林果。适应性强，常生于向阳山坡灌丛中。喜湿润肥沃土壤。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
62	斑叶稠李 (山桃稠李、山桃)	<i>Prunus maackii</i> (Rupr.) Kom.	蔷薇科、稠李属	喜光，稍耐阴。耐严寒和轻盐碱。主要用于景观绿化。常生于林内、林缘或河岸等地。喜湿润土壤。			○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市。</p>

63	稠李 (臭李子)	<i>Padus racemosa</i> (Lam.) Gilib.	蔷薇 科、稠 李属	喜光，稍耐阴。耐酷寒，耐湿，耐轻盐碱，不耐干旱。主要用于景观绿化。常生于林内或河岸。喜湿润排水良好土壤。			○	○	○			<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
64	山皂荚 (皂角)	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	豆科、 皂荚属	喜光。幼时耐寒性差，耐干旱贫瘠，耐轻盐碱，耐空气污染。主要用于药用、景观绿化。			○	○			<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、阿城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县。</p>	

65	朝鲜槐 (山槐、怀槐、黄色木、高丽槐)	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	豆科、 马鞍树属	喜光，稍耐荫。耐寒，耐旱。慢生珍贵树种。主要用于用材、药用、林化工业原料、蜜源、环境保护。常生于红松阔叶混交林下、林缘及河流两岸、山谷中，可生长于山坡灌丛中。喜深厚肥沃湿润土壤。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市:</b> 龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b> 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
66	胡枝子 (帚条儿)	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	豆科、 胡枝子属	喜光。耐酷寒、干旱、贫瘠，耐轻盐碱。主要用于防风固沙。常生于山坡杂木林或林缘。			○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>

67	兴安胡枝子	<i>Lespedeza davurica</i> Laxm.Schindl.	豆科、 胡枝子 属	喜光。耐寒、干旱瘠薄。主要用于防风固沙。常生于干旱山坡、草地、路边及砂地。			○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、阿城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
68	树锦鸡儿 (黄槐、柠条儿)	<i>Caragana arborescens</i> (Amm) Lam.	豆科、 锦鸡儿 属	喜光。耐寒、干旱、贫瘠，耐轻盐碱，耐空气污染，不耐重盐碱和水湿。主要用于防风固沙、水土保持、水源涵养、木质能源。			○	○			<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市。</p>

69	小叶锦鸡儿 (柠条儿)	<i>Caragana microphylla</i> Lam.	豆科、 锦鸡儿 属	喜光。耐酷寒、干旱、风沙和贫瘠，耐轻盐碱，耐污染，不耐水湿和重盐碱。主要用于防风固沙、水土保持、水源涵养、木质能源。常生于砂地、砂丘及干燥山坡。		○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
70	黄檗 (黄菠萝、黄柏)	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	芸香 科、黄 檗属	喜光，耐中等庇荫。耐寒，不耐旱和水湿。慢生珍贵树种。主要用于用材、水源涵养、药用、环境保护。常生于河岸，肥沃谷地或低山坡。喜深厚、湿润、排水良好土壤。	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>桦南县。鸡西市:鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>南岔县、铁力市；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b>北安市、五大连池市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

71	白杜 (华北卫矛)	<i>Euonymus maackii</i> Rupr.	卫矛科、卫矛属	喜光，中等庇荫。耐严寒、干旱、贫瘠，耐轻盐碱，不耐水湿和重盐碱。常生于河流两岸冲击土开阔地、较疏阔叶林内。			○	○			<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、阿城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。
72	卫矛 (鬼箭、山鸡条子)	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb	卫矛科、卫矛属	喜光，中等庇荫。耐严寒、干旱、贫瘠，耐轻盐碱，不耐水湿和重盐碱。常生于采伐迹地、阔叶林或杂草丛。喜肥沃土壤。			○	○			<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、阿城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。
73	黄心卫矛 (翅卫矛、黄瓢子)	<i>Euonymus macropterus</i> Rupr.	卫矛科、卫矛属	喜光，中等庇荫。耐严寒、干旱、贫瘠，耐轻盐碱，不耐水湿和重盐碱。常生于岩石裸地或砂质土的针阔混交林或阔叶林。			○	○			<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、阿城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。

74	色木槭 (色树、五角槭、五角枫)	<i>Acer mono Maxim.</i>	槭树科、槭树属	中性树种。稍耐荫，耐严寒，不耐旱，不耐涝。慢生，主要用于用材、水土保持、环境保护和景观绿化。常生于山坡、河(溪)边、平地。土壤适应性强，可生于酸性、中性、石灰岩性土壤，喜湿润肥沃土壤。			○	○	○		<p><b>哈尔滨:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>
75	茶条槭(茶条子)	<i>Acer ginnala Maxim.</i>	槭树科、槭树属	喜光。耐严寒，耐轻盐碱，不耐干旱、喜湿润。主要用于用材和景观绿化。常生于坡地、河流两岸。土壤适应性较强。			○	○	○	○	<p><b>哈尔滨:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>

76	花楷槭 (花楷子)	<i>Acer ukurunduense</i> Trautv.et Mey	槭树 科、槭 树属	中性树种，较喜荫。耐严寒，不耐旱，不耐涝。主要用于景观绿化。常生于疏林、针阔叶混交林。喜湿润土壤。			○	○			<b>哈尔滨：</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市：</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市：</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市：</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市：</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市：</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市：</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市：</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市：</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。
77	青楷槭 (青楷子，辽东槭)	<i>Acer tegmentosum</i> Maxim.	槭树 科、槭 树属	不喜全光与强光，耐阴。耐严寒，不耐干旱、贫瘠。主要用于景观绿化。常生于背荫的沟谷、溪流两侧。可生于阴坡、半阴坡的疏林地。喜湿润、肥沃土壤。			○	○			<b>哈尔滨：</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市：</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市：</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市：</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市：</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市：</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市：</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市：</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市：</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。
78	三花槭 (拧劲槭、 柠筋槭、伞 花槭)	<i>Acer triflorum</i> Kom.	槭树 科、槭 树属	喜光，中等庇荫。耐寒，不耐严寒、干旱，不耐涝。主要用于景观绿化。常生于针阔混交林或阔叶混交林。喜湿润肥沃土壤。			○	○	○		<b>牡丹江市：</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>哈尔滨市：</b> 尚志市、双城、阿城、五常。
79	东北槭 (白牛槭、 关东槭)	<i>Acer mandshurica</i> Maxim.	槭树 科、槭 树属	喜光，中等庇荫。耐寒，不耐严寒、干旱，不耐涝。主要用于景观绿化。常生于针阔叶混交林或阔叶林。			○	○	○		<b>牡丹江市：</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>哈尔滨市：</b> 尚志市、双城、阿城、五常。

80	复叶槭 (糖槭、白蜡槭)	<i>Acer saccharum</i> Marshall.	槭树科、槭树属	喜光，稍耐荫。耐严寒，耐轻盐碱。稍耐水湿，不耐干旱，耐空气污染。主要用于景观绿化。常生于坡地、河流两岸。喜湿润肥沃土壤。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原区、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>
81	小叶鼠李	<i>Rhamnus parvifolia</i> Bge.	鼠李科、鼠李属	喜光，中等庇荫。耐严寒、干旱、贫瘠。主要用于景观绿化、防风固沙。土壤适应性较强。			○	○	○		<p><b>哈尔滨：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原区、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。</p>

82	金刚鼠李	<i>Rhamnus diamantiaca</i> Nakai.	鼠李科、鼠李属	喜光，中等庇荫。耐严寒，耐轻盐碱。主要用于景观绿化。常生于向阳山坡、草丛或灌丛中。土壤适应性较强。			○	○	○			<p><b>哈尔滨：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>
83	乌苏里鼠李	<i>Rhamnus ussuriensis</i> J.Vassil	鼠李科、鼠李属	喜光，中等庇荫。耐严寒，耐轻盐碱。主要用于景观绿化、药用。常生于河边、山地林中或山坡灌丛。土壤适应能力较强。			○	○	○			<p><b>哈尔滨：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。</p>

84	鼠李 (兴安鼠李, 老鸱眼)	<i>Rhamnus davurican</i> Pall.	鼠李 科、鼠 李属	喜光，中等庇荫。耐严寒，耐 轻盐碱。主要用于景观绿化。 常生于向阳山坡、草丛或灌丛 中，土壤适应性较强。			○	○	○		<p><b>哈尔滨：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县。</p>
85	东北鼠李	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino.	鼠李 科、鼠 李属	喜光，中等庇荫。耐寒，不耐 干旱、贫瘠。主要用于景观绿 化。常生于向阳山坡或灌丛 中。喜湿润、肥沃土壤。			○	○	○		<p><b>哈尔滨：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>

86	山葡萄 (阿穆尔葡萄、木龙、烟黑)	<i>V. amurensis</i> Rupr.	葡萄科、葡萄属	喜光，稍耐荫。耐酷寒，稍耐干旱，不耐贫瘠。主要用于林果。常生于山坡、沟谷地中或灌丛。喜湿润和较肥沃土壤。	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市:</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市:</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
87	辽椴 (糠椴、大叶椴)	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr.et Maxim.	椴树科、椴树属	喜光，耐中等庇荫。耐寒，不耐干旱和水湿。中生树种，主要用于用材。常生于山地及谷地，散生于疏开林内。	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。</p>

88	紫椴 (籽椴)	<i>Tilia amurensis</i> Rupr.	椴树 科、椴 树属	喜光、幼时耐庇荫。不耐旱、水湿,较耐寒。慢生珍贵树种,主要用于用材、水源涵养。喜温凉湿润气候,多生长在山中下腹,适于土层深厚、排水良好的沙壤土。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市; <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市; <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市; <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市; <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县; <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县。鹤岗市: 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县; <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市; <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市; <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市; <b>大兴安岭地区:</b> 松岭区、呼玛县; <b>齐齐哈尔市:</b> 龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市; <b>大庆市:</b> 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
89	软枣猕猴桃 (软枣子)	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb.et Zucc.) Planch.ex.Miq.	猕猴桃 科、猕 猴桃属	喜光、耐中等庇荫。不耐酷寒、干旱、贫瘠。主要用于林果。常生于混交林或者水分充足的杂林中。喜疏松、土层深厚、腐殖质含量高的土壤。	○	○	○				<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市; <b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市; <b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市; <b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市; <b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县; <b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县; <b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县; <b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市; <b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市; <b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市; <b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>

90	狗枣猕猴桃 (狗枣子)	<i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim.et Rupr.) Maxim.	猕猴桃科、猕猴桃属	喜光、耐中等庇荫。耐严寒，不耐贫瘠。主要用于林果。常生于混交林或林地的开阔地，喜半阴坡针阔混交林及灌木林。适于腐殖质肥沃土壤。		○	○	○				<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>
91	刺五加 (坎拐棒子)	<i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr.) et Maxim. Harms.	五加科、五加属	稍喜光，耐荫。耐严寒，不耐干旱、水湿、贫瘠和盐碱。主要用于药用。常生于山坡林中及路旁灌丛中。适生于腐殖质层深厚、土壤微酸性的砂质壤土。		○	○	○			<p><b>哈尔滨市:</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>绥化市:</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>黑河市:</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>	

92	无梗五加 (五加皮)	<i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (Rupr. et Maxim.) Seem.	五加 科、五 加属	稍喜光，耐荫。耐严寒，不耐 干旱贫瘠和盐碱。主要用于药 用。常生于森林和灌丛中。适 于土质疏松、肥沃、有机质丰 富，温润、保水保肥的壤土或 沙壤土。		○	○	○				<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。
93	龙牙楸木 (刺老芽、 刺嫩芽、刺 老鸦)	<i>Aralia elata</i> Miq. Seem.	五加 科、楸 木属	稍喜光，耐荫。耐严寒，不耐 干旱、贫瘠和盐碱。主要用于 食用、药用。常生于阴坡或者 半阴坡。喜湿润和较肥沃土 壤。	○	○	○	○			<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。	

94	红瑞木	<i>Cornus alba</i> Linn.	山茱萸科、山茱萸属	较喜阴。喜湿，耐酷寒，耐轻盐碱，不耐贫瘠。主要用于景观绿化。常生于溪流两岸针阔叶混交林、阔叶林或林缘。喜排水良好的冲积土。							○	○	○	<p><b>哈尔滨:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。</p>
95	偃伏柞木	<i>Cornus stolonifera</i> Michx.	山茱萸科、山茱萸属	喜光，庇荫条件下生长慢。抗寒，抗病虫。主要用于景观绿化。适应性广。							○	○	○	<p><b>哈尔滨:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b> 牡丹江市 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市。</p>
96	杜香 (喇叭茶)	<i>Ledum palustre</i> Linn.	杜鹃花科、杜香属	耐寒。喜凉爽湿润气候，常生于落叶松林、樟子松林、云杉林或针阔叶混交林。适于于富含腐殖质、湿润而肥沃的微酸性土壤。									○	<p><b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>黑河市:</b>爱辉区、逊克县、五大连池市；<b>大兴安岭地区:</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市。</p>



100	水曲柳	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	木犀科、栲属	喜光，幼时稍耐荫。耐寒，不耐旱，稍耐水湿和盐碱。中生珍贵树种。主要用于用材、林化工业原料、水源涵养、环境保护。适生于山地中下部、缓坡，山麓或溪谷两岸，河岸平地。喜冷湿、温湿气候，晚春易受霜害，喜生于土层深厚、肥沃、疏松、湿润土壤。常与红松、核桃楸、榆树等树种伴生。	○	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>新林区、塔河县；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
101	东北连翘 (连翘)	<i>Forsythia mandshurica</i> Uyeki.	木犀科、连翘属	喜光，耐半阴。耐寒、耐旱、耐轻盐碱。主要用于药用、水土保持、景观绿化。常生于山坡。对土壤适应性强。			○	○	○	<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>	

102	辽东丁香	<i>Syringa villosa</i> subsp. <i>wolfii</i> (C. K. Schneider) J. Y. Chen & D. Y. Hong	木犀科、丁香属	喜光。不耐干旱，稍耐水湿。主要用于景观绿化、环境保护。喜温暖气候，常生于山坡杂木林、灌丛、林缘、河边或针、阔叶混交林中。适于沙壤土或壤土。			○	○	○			<b>哈尔滨市：</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、延寿县、尚志市、五常市。
103	红丁香	<i>Syringa villosa</i> Vahl.	木犀科、丁香属	喜光。耐寒、旱、贫瘠，耐轻盐碱，不耐荫。主要用于景观绿化。常生于高海拔山坡灌丛或沟边、河旁。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市：</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市：</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市：</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市：</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市：</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市：</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市：</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市：</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市：</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>黑河市：</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区：</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市； <b>齐齐哈尔市：</b> 龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市； <b>大庆市：</b> 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。	

104	紫丁香	<i>Syringa oblata</i> Lindl.	木犀科、丁香属	喜光，不耐阴。耐严寒、干旱、轻盐碱，耐瘠薄。主要用于景观绿化、林化工业原料。常生于山坡、丛林、山沟、溪边、山谷路旁及滩地水边。适于排水良好的肥沃土壤。	○	○	○	○	○	○	<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
105	什锦丁香	<i>Syringa × chinensis</i> Schmidt.	木犀科、丁香属	喜光。稍耐阴，也耐寒旱。主要用于景观绿化。喜肥沃湿润土壤。			○	○	○	<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市。</p>	

106	暴马丁香 (暴马子、白丁香)	<i>Syringa reticulata</i> subsp. <i>amurensis</i>	木犀科、丁香属	喜光，耐中等庇荫。耐酷寒，不耐瘠薄、干旱和盐碱。中生树种。主要用于用材、药用、林化工业原料、蜜源。	○	○	○	○	○		<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>黑河市：</b>爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市；<b>大兴安岭地区：</b>加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县、漠河市；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>
107	小叶丁香 (小叶巧玲花)	<i>Syringa pubescens</i> Turcz. subsp. <i>microphylla</i> (Diels) M. C. Chang & X. L. Chen	木犀科、丁香属	喜光。耐寒耐旱，耐贫瘠、轻盐碱。主要用于景观绿化、药用。常生于山谷林下、林缘或河边，山顶草地或石缝间。适于肥沃的沙壤土及壤土。			○	○	○		<p><b>哈尔滨市：</b>道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市：</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市：</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市；<b>鸡西市：</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市：</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市：</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市：</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市：</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市；<b>绥化市：</b>北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市；<b>齐齐哈尔市：</b>龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市；<b>大庆市：</b>萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。</p>

108	辽东水蜡树	<i>Ligustrum obtusifolium</i> subsp. <i>suave</i> (Kitagawa) Kitagawa.	木犀科、女贞属	喜光。稍耐荫、水湿，不耐盐碱。主要用于水源涵养、环境保护、风景。喜温湿气候，常生于田边、山坡、溪流旁。喜土层深厚、肥沃、疏松、湿润土壤。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、延寿县、尚志市、五常市。
109	杠柳	<i>Periploca sepium</i> Bunge.	萝藦科、杠柳属	喜光。稍耐寒，耐干旱、贫瘠，耐轻盐碱，不耐涝。主要用于药用、景观绿化和饲料。可生于平原及低山丘的林缘、沟坡、河边沙质地或地埂等。			○	○			<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>齐齐哈尔市:</b> 龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市； <b>大庆市:</b> 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区、肇州县、肇源县、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县。
110	东北接骨木 (马尿骚)	<i>Sambucus mandshurica</i> Kitag.	忍冬科、接骨木属	喜光，稍耐荫。耐酷寒，耐干旱，耐水湿，耐中度苏打盐碱。主要用于景观绿化和药用。常生于山坡、灌丛、沟边等地。			○	○	○	○	<b>哈尔滨市:</b> 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>绥化市:</b> 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县； <b>齐齐哈尔市:</b> 龙沙区、建华区、铁锋区、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、依安县、泰来县、甘南县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县、讷河市。

111	修枝荚蒾 (暖木条荚蒾、暖树条子)	<i>Viburnum burejaeticum</i> Rgl.	忍冬科、忍冬属	喜光，较耐荫。耐严寒，耐旱，耐修剪。主要用于景观绿化和林果。常生于针阔叶混交林中。喜肥沃土壤。			○	○	○			<b>哈尔滨市:</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、丰林县、大箐山县、南岔县、铁力市。
112	鸡树条荚蒾 (鸡树条子、佛头花)	<i>Viburnum opulus</i> subsp. <i>calvescens</i>	忍冬科、忍冬属	喜光，稍耐荫。耐旱，耐轻盐碱，耐病虫害。主要用于景观绿化、林果和药用。常生于溪谷边疏林下或灌丛中。			○	○	○			<b>哈尔滨市:</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、丰林县、大箐山县、南岔县、铁力市。
113	蓝果忍冬 (蓝靛果、山茄子、羊奶子)	<i>Lonicera caerulea</i> var. <i>enulis</i> Turcz et Herd	忍冬科、忍冬属	喜光，耐中等庇荫。耐酷寒，耐水湿。主要用于景观绿化和林果。可生于砂壤土、壤土、重壤土。			○	○	○			<b>哈尔滨市:</b> 阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市； <b>牡丹江市:</b> 东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市； <b>佳木斯市:</b> 向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、抚远市、同江市、富锦市； <b>鸡西市:</b> 鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市； <b>双鸭山市:</b> 尖山区、岭东区、四方台、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县； <b>七台河市:</b> 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县； <b>鹤岗市:</b> 向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县； <b>伊春市:</b> 伊美区、乌翠区、友好区、金林区、汤旺县、丰林县、大箐山县、南岔县、嘉荫县、铁力市； <b>黑河市:</b> 爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市； <b>大兴安岭地区:</b> 加格达奇区、松岭区、新林区、呼中区、呼玛县、塔河县。

114	金银忍冬 (马氏忍冬、金银木、王八骨头)	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	忍冬科、忍冬属	喜光，稍耐庇荫。耐酷寒，耐水湿，耐轻盐碱，耐病虫害。主要用于景观绿化和林果。常生于林中或林缘溪流附近的灌木丛。可生于土层深厚、肥沃、湿润土地。			○	○	○		○	<p><b>哈尔滨市:</b>阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市；<b>牡丹江市:</b>东安区、阳明区、爱民区、西安区、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市、东宁市；<b>佳木斯市:</b>向阳区、前进区、东风区、郊区、桦南县、桦川县、汤原县、富锦市；<b>鸡西市:</b>鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区、鸡东县、虎林市、密山市；<b>双鸭山市:</b>尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县；<b>七台河市:</b>新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县；<b>鹤岗市:</b>向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县、绥滨县；<b>伊春市:</b>伊美区、乌翠区、友好区、金林区、丰林县、大箐山县、南岔县、铁力市。</p>
-----	-------------------------	--	---------	---	--	--	---	---	---	--	---	---